

Ulotka informacyjna dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepisy § 19 ust. 5 (**obowiązujące dla gospodarstw utrzymujących 10 lub więcej loch**) oraz przepisy § 24 ust. 3 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie *wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej* (Dz. U. 2010, nr 56, poz. 344 z póź. zm),

Minimalne warunki utrzymywania świń

Lochy i loszki od 4. tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem prosięnia utrzymuje się grupowo.

W przypadku utrzymywania świń w systemie grupowym:

- 1) w grupę łączy się zwierzęta o zbliżonym wieku;
- 2) podejmuje się działania minimalizujące agresję i zapobiegające walkom zwierząt, tj. utrzymuje się w warunkach:
 - nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień;
 - zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia;
 - umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami.
- loszki i lochy w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin prosięnia oraz w okresie prosięnia mogą być utrzymywane w warunkach, w których nie mają kontaktu wzrokowego z innymi zwierzętami.
- utrzymywane grupowo świnię chore, zranione, wykazujące agresję lub atakowane przez inne zwierzęta czasowo utrzymuje się pojedynczo.
- świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.

Świń nie utrzymuje się na uwięzi.

Wytyczne odnośnie kojca

Powierzchnia kojca, w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić, w przypadku utrzymywania grupowo:

- 1) loch - co najmniej 2,25 m², przy czym w przypadku loch prośnych co najmniej 1,3 m² powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe;
- 2) loszek po pokryciu - co najmniej 1,64 m², przy czym co najmniej 0,95 m² powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe.

Powierzchnia kojca, w przypadku utrzymywania w grupie loch lub loszek po pokryciu:

- 1) do 5 sztuk - powinna być większa o 10 %;
- 2) powyżej 39 sztuk - może być mniejsza o 10 %.

W przypadku utrzymywania w gospodarstwie co najmniej 10 loch lub loszek, w okresie, długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:

- 1) do 5 sztuk - co najmniej 2,41 m;
- 2) powyżej 5 sztuk - co najmniej 2,81 m.

Kojec, w którym utrzymuje się lochy i loszki w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin ich prosięnia, zaopatruje się w materiał umożliwiający budowę gniazda, chyba że nie jest to możliwe ze względu na stosowany w gospodarstwie system odprowadzania gnojowicy.

Powierzchnia kojca do prosięnia powinna umożliwiać prosięnie naturalne lub zapewniać osobie obsługującej dostęp do zwierzęcia.

Kojec buduje się w sposób zapewniający prosiętom swobodny dostęp do karmiącej lochy.

W przypadku utrzymywania loch z prosiętami:

- 1) kojec wyposaża się w przegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę;
- 2) w kojcu wydziela się część ze ściółką o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek prosiąt.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim **wskazuje na konieczność** modernizacji ferm, tak, aby od dnia 1 stycznia 2013 r. spełniały powyższe wymagania.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, ul. Wyspiańskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski, nr telefonu 54 282 27 03.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Aleksandrowie Kujawskim